

Andrea Carati – Luigi Galgani

Appunti di Meccanica Razionale II

Anno Accademico 2008–2009



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Indice

1	Ordine e caos nei sistemi dinamici.	1
1.	Introduzione. Poincaré e la rivoluzione degli anni '60: Fermi, Pasta e Ulam (FPU), Lorenz, Hénon	1
2.	Lo standard map: visualizzazione numerica	10
3.	Due esempi di coesistenza di moti ordinati e caotici: il pendolo forzato e il sistema di Hénon e Heiles	18
4.	Lo standard map imperturbato	26
5.	Lo standard map perturbato	29
6.	Classificazione delle trasformazioni lineari simplettiche piane	30
7.	L'ultimo teorema di Poincaré: il twist map	33
8.	Il teorema della varietà stabile e i punti omoclíni di Poincaré	40
9.	Il gatto di Arnol'd e i sistemi iperbolici (o di Anósov)	50
	Appendici	55
A.1	Dimostrazione del Teorema della Varietà Stabile	55
A.1.1	Rappresentazione delle successioni convergenti al punto fisso	55
A.1.2	Studio dell'esistenza del punto fisso	58
A.1.3	La varietà stabile	60
A.1.4	La dimostrazione del teorema delle contrazioni	61
A.1.5	Lo spazio dello successioni convergenti come spazio di Banach	62
A.2	Integrazione numerica della equazione di Newton	63
A.3	Listati dei programmi usati per generare le figure	67
A.3.1	Standard map	67
A.3.2	Pendolo forzato	69
A.3.3	Il sistema di Hénon ed Heiles	71
A.3.4	Le varietà stabili ed instabili	73
2	Introduzione alla Teoria delle Perturbazioni	77
1.	Introduzione	77
2.	La perturbazione del moto	78
3.	Stima della crescita dell'errore	79

4. Principio della Media	82
5. L'azione come invariante adiabatico: sistemi monodimensionali . . .	86
6. Il caso dell'oscillatore armonico	91
7. Il momento magnetico come invariante adiabatico, e lo specchio magnetico	93
8. Il teorema della media per sistemi con piú angoli veloci	96
9. Il caso hamiltoniano bidimensionale	99
10. Le coordinate azione–angolo per sistemi integrabili bidimensionali: il Teorema di Arnold–Liouville	101
11. Le coordinate azione–angolo per il moto Kepleriano	105
12. Le variabili d'azione	106
13. Le variabili angolari	108
A Appendici	111
A.1 Il M.C.D. di due interi	111
A.2 Dimostrazione dell'integrabilità della forma $\mathbf{p} \cdot d\mathbf{q}$	112
3 Introduzione alla Teoria Ergodica	115
1. Introduzione	115
2. Il gas perfetto	116
3. Il teorema del viriale: un modello piú realistico di gas perfetto	118
4. Dipendenza delle Medie Temporalí dai dati iniziali	120
5. Distribuzione di Probabilità dei dati iniziali	124
6. Il teorema del ritorno di Poincaré	127
7. L'evoluzione come operatore unitario sulle osservabili	130
8. Il Teorema ergodico di von Neumann	132
9. L'approccio all'equilibrio: proprietà di mixing dei flussi	135
10. Un esempio di sistema mixing	138
11. L'irreversibilità macroscopica tramite la reversibilità microscopica: l'esempio del calore specifico	140
12. La Termodinamica come teoria delle grandi deviazioni	146
13. Il teorema di Cramér–Gartner	147
14. Applicazione: la distribuzione di Maxwell–Boltzmann delle velocità	151
15. Il lemma di Varadhan	152
16. Probabilità condizionata e distribuzione canonica	155
Appendici	157
A.1 Il teorema di Krylov–Bogoliubov	157
A.2 Dimostrazione del teorema di Kac.	163

Prefazione

In queste dispense abbiamo raccolto le lezioni che teniamo per il corso di Meccanica razionale II per fisici e per il corso di Sistemi dinamici 1 per matematici, entrambi corsi del terzo anno per la laurea triennale. Il corso prevede anche delle esercitazioni al calcolatore in cui si tracciano i ritratti in fase per lo standard map (con particolare attenzione ai punti omoclini), e si integrano le equazioni differenziali per il modello di Hénon e Heiles e per il pendolo forzato.

Il testo contiene tre capitoli di natura alquanto diversa.

Il primo, dal titolo “Ordine e caos nei sistemi dinamici” è di tipo introduttivo e di carattere molto discorsivo. Vorrebbe introdurre il lettore al problema del passaggio dall’ordine al caos nei sistemi integrabili perturbati in maniera “facilmente leggibile”. Sostanzialmente, dopo un breve excursus storico su quella che abbiamo chiamato la rivoluzione degli anni ’60 e avere illustrato l’esempio dello standard map, il capitolo è centrato sul cosiddetto *ultimo teorema di Poincaré*, di cui viene fornita la dimostrazione nella versione di Arnold (dal libro di Arnold e Avez). Viene poi enunciato il teorema della varietà stabile (la cui dimostrazione è riportata in Appendice), e viene illustrato il punto omoclinico e come esso porti ai moti caotici.

Il secondo capitolo contiene una introduzione alla teoria delle perturbazioni. Preso atto che in generale le equazioni differenziali non si sanno risolvere, si cerca di essere garantiti che le soluzioni corrispondenti a certi dati iniziali restino vicine, entro certi tempi, a dei particolari movimenti che si possono facilmente descrivere. Si mette anzitutto in luce come in generale le informazioni vengano perse in maniera esponenzialmente veloce. Si dà poi il teorema della media, che invece fornisce buone informazioni (sotto certe condizioni) se il sistema è una piccola perturbazione di un sistema che ha delle costanti del moto (variabili lente) e una variabile (angolare) veloce. Si considera poi in particolare il caso hamiltoniano, in cui per il sistema imperturbato si introducono le variabili angolo-azione, e si mostra come nel caso perturbato si ottenga l’esistenza di invarianti adiabatici.

Il terzo capitolo (scritto in maniera alquanto provvisoria) vuole essere una introduzione alla teoria ergodica da un punto di vista abbastanza particolare. Infatti, ai giorni nostri la teoria ergodica può essere presentata come un capitolo della teoria delle probabilità o come un capitolo molto astratto della matematica originato dalla teoria dei sistemi dinamici, che riguarda il comportamento delle traiettorie su tempi infiniti. Qui invece si cerca di fare un ponte con le origini stesse del problema, in relazione ai fondamenti dinamici della meccanica statistica, secondo un procedimento il cui modello di riferimento è il classico libro di Khinchin. A tal fine, si comincia mostrando anzitutto come la teoria cinetica conduca spontaneamente allo studio delle medie temporali delle osservabili. Nella trattazione qui svolta, a differenza della maggior parte delle trattazioni disponibili, viene privilegiato il punto di vista di von Neumann rispetto a quello di Birkhoff, e viene appunto data la dimostrazione del teorema ergodico di von

Neumann. La ragione di questa scelta sta nel fatto che gli autori concordano con von Neumann nel ritenere il suo approccio come fisicamente più significativo. Il motivo principale è che l'approccio di von Neumann permette in linea di principio di descrivere la rapidità dell'approccio all'equilibrio (cioè di descrivere i tempi entro i quali le medie temporali rilassano concretamente al loro valore finale, che formalmente viene descritto mediante il limite per $t \rightarrow \infty$). Questo punto di vista (illustrato da von Neumann in un suo breve ma incisivo articolo, che non abbiamo ancora avuto il tempo di riassumere in queste note) sembra particolarmente adatto alla descrizione dei fenomeni di apparente equilibrio di "tipo vetroso" che sono oggi tanto studiati dopo il classico lavoro di Fermi, Pasta e Ulam (del 1955) e che sono di particolare interesse anche per le ricerche originali degli autori di queste note. Contiamo di aggiungere presto una nuova parte sui fondamenti della meccanica statistica di equilibrio, inquadrando l'insieme di Gibbs nell'ambito della teoria delle grandi deviazioni.